



%/٨
يدفعال

پس از دوشش
★★★★★



محصول گروه شرکت‌های زانیار

@ Xaniargroup

آنالیز شیمیایی محصول

| | |
|----------------|-----------------------------|
| ماده مؤثره | يد فعال ٨٪ درصد |
| ماده نرم کننده | کلیسین |
| pH | ٣ تا ٥ |
| رنگ | قهوه‌ای |
| چگالی | ٠,٩ تا ١,١ گرم بر میلی لیتر |
| وزن مخصوص | ٩,٨ نیوتون بر متر مکعب |

X-Guard Gold

ایکس گارد طلایی

محلول ضدغونی کننده‌ی پس از دوشش برای سرپستانک دام
 مناسب برای سرپستانک‌های گاو، گوسفند و بز شیری

مقدار و راهنمای مصرف

- به صورت آماده مصرف تهیه شده است و نیاز به هیچ گونه آماده سازی ندارد.
- برای ضدغونی کردن سرپستانک از دیپ کاپ مناسب که مایع موجود در کاپ نتواند به مخزن آن برگردان استفاده شود.
- تمامی طول سرپستانک باید در تیت گارد غوطه ور شود. بسته به نظر دامپزشک و شرایط گله می‌توان به تنها ای ایکس گارد زانیار یا به صورت ترکیبی با هم‌زمان زانیار استفاده کرد.



ویژگی‌ها و مزایا

- حاوی گلیسرین مرغوب جهت نرم کنندگی پوسه‌ت سرپستانک
- حاوی %/٨ يد فعال
- چکه کنترل شده
- پوشش پکارچه سرپستانک
- ضدغونی کننگی قوی علیه باکتری‌های مسربی به ویژه مایکوپلاسمابوویس
- حداقل زمان لازم جهت ازین بردن باکتری‌های بیماری‌زا (۳۰ ثانیه)
- کاهش شیوع ورم پستانک‌های تحت بالینی در گله‌های شیری

طرح پنج گانه کنترل ورم پستان

(National Mastitis Council Protocol)

۱. انجام بی نقص مراحل شیردوشی

جهت پیشگیری از اورام پستان جدید



۲. نگهداری صحیح دستگاه شیردوش و بازدید منظم آنها

جهت پیشگیری از اورام پستان جدید



۳. مدیریت گاوها خشک

جهت پیشگیری از اورام پستان جدید و مدیریت گاوها مبتلا به ورم پستان




۴. درمان موارد ورم پستان های بالینی و تحت بالینی

جهت پیشگیری از اورام پستان جدید و مدیریت گاوها مبتلا به ورم پستان



۵. حذف موارد مزمن ورم پستان

جهت پیشگیری از اورام پستان جدید و مدیریت گاوها مبتلا به ورم پستان



ایکس گارد طلایی

ضد عفونی سرپستانک، گام مهمی در کنترل ورم پستان گاو در گله های شیری است. پوست سرپستانک گاو می تواند محل مناسبی برای رشد انواع باکتری های محیطی و مسری باشد. بنابراین برای جلوگیری از آنودگی کارتیه ها به باکتری های محیطی که عمدها به دلیل کثیف بودن سرپستانک ها به کود و بستر می باشد استفاده از ضد عفونی کننده های پیش از دوشش یا پری دیپ ضروری است؛ همچنین برای جلوگیری از آنودگی کارتیه ها به انواع باکتری های مسری، باید از ضد عفونی کننده های پس از دوشش یا پست دیپ استفاده نمود. در واقع استفاده از این ضد عفونی کننده ها به طور مناسب یکی از اقدامات پنج گانه ای کنترل ورم پستان در سطح گله های شیری است. ایکس گارد محصولی بر پایه ید بوده که با توجه به فرمولا سیون پیشرفته، ید را به آرامی آزاد کرده و همیشه غلظت یکسانی از ید در دسترس خواهد بود؛ همچنین گلیسیرین استفاده شده در این محصول از خشک شدن سرپستانک ها جلوگیری می کند.

نتایج اثربخشی ایکس گارد طلایی بر باکتری های مختلف در ۳۰ ثانیه تماس:

| باکتری | اثربخشی |
|----------|----------------------|
| ای. کلای | استافیلوکوکوس اورئوس |
| مثبت ۵ | استرپتوکوکوس یوپریس |
| مثبت ۵ | سامونلا انتریکا |
| مثبت ۵ | سودوموناس آتروژینوزا |
| مثبت ۵ | کاندیدا آلبیکنس |
| مثبت ۵ | آسپرژیلوس نایجر |